

NOROCARP

Tabelas de dosagem

DOSE INICIAL

4 mg de carprofeno/kg peso corporal/dia.

A dose inicial pode ser administrada por mais de 5 dias.

Tabela da Dose de Manutenção	Número de comprimidos por dose, duas vezes ao dia		
Peso Corporal (kg)	20 mg	50 mg	100 mg
5.0	1		
10.0	2		
12.5		1	
15.0	3		
20.0	4		
25.0		2	1
37.5		3	2
50		4	3

DOSE DE MANUTENÇÃO

2 mg de carprofeno/kg peso corporal/dia.

Para tratamentos de longa duração, que deverão ser monitorizados pelo médico veterinário.

Tabela da Dose de Manutenção	Número de comprimidos por dose, uma vez ao dia		
Peso Corporal (kg)	20 mg	50 mg	100 mg
5.0	1		
10.0	2		
12.5		1	
15.0	3		
20.0	4		
25.0		2	1
37.5		3	2
50		4	3

NOROCARP

NOROCARP 20 mg comprimidos para cães

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Cada comprimido contém: Substância(s) activa(s): Carprofeno 20 mg. **FORMA FARMACÉUTICA:** Comprimidos. Um comprimido branco circular com uma linha de corte num dos lados e o número "20" no lado oposto. **Espécie(s)-alvo:** Caninos (Cães). **Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo:** Para analgesia e redução da inflamação crónica em perturbações músculo-esqueléticas em cães, como no caso da doença degenerativa das articulações. **Posologia e via de administração:** Para administração oral. É recomendada uma dose inicial de 2 a 4 mg de carprofeno/kg peso corporal/dia, a ser administrada numa única dose ou dividida em duas doses iguais. A dose poderá ser reduzida a 2 mg carprofeno/kg peso corporal/dia, administrada como uma dose diária de manutenção após 7 dias, sujeita a resposta clínica: ver a dose de manutenção na tabela abaixo apresentada. **Tabela da Dose de Manutenção:** Peso Corporal (kg) - Número de comprimidos por dose (20 mg): 5.0 - f; 10.0 - ò; 15.0 - ô; 20.0 - ô. A duração do tratamento dependerá da resposta observada. Tratamentos de longa duração deverão estar sob supervisão veterinária regular. **Contra-indicações:** A administração deste medicamento veterinário está contra-indicada em gatos. Não administrar a cães que sofram de doença cardíaca, hepática ou renal, em casos onde exista a possibilidade de ulceração gastrointestinal ou hemorragia, ou em casos em que existam evidências de discrasia sanguínea ou hipersensibilidade ao medicamento veterinário. **Reacções adversas:** Foram reportados efeitos secundários típicos associados aos AINE's como vômitos, fezes moles/diarreia, sangue oculto nas fezes, perda de apetite e letargia. Estas reacções adversas ocorrem geralmente durante a primeira semana de tratamento e na maior parte dos casos são passageiros e desaparecem após o termo do tratamento mas em casos raros podem ser severos ou fatais. Caso ocorram reacções adversas, a administração do medicamento veterinário deve ser suspensa e deve informar-se o médico veterinário. Como acontece no caso de outros AINEs, existe o risco de ocorrerem efeitos idiossincráticos adversos a nível renal e hepático. **Medicamento veterinário sujeito a receita médico veterinária.** N.º A.I.M.: 51536; **Apresentações:** Blisters de Alumínio contendo 10 comprimidos (20 mg) por tira em caixas de 20 e 100 comprimidos. **TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO:** Norbrook Laboratories Limitada, Station Works, Camlough Road, NEWRY, Co. Down, BT35 6JP, Irlanda do Norte. **Distribuidor:** PRODIVET, Comércio de Produtos Químicos, Farmacêuticos e Cosméticos, SA - Av. Infante D. Henrique nº 333 H 3º piso Esc. 41 - 1800-282 Lisboa

NOROCARP 50 mg comprimidos para cães

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Cada comprimido contém: Substância(s) activa(s): Carprofeno 50 mg. **FORMA FARMACÉUTICA:** Comprimidos. Um comprimido branco circular com uma linha de corte num dos lados e o número "50" no lado oposto. **Espécie(s)-alvo:** Caninos (Cães). **Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo:** Para analgesia e redução da inflamação crónica em perturbações músculo-esqueléticas em cães, como no caso da doença degenerativa das articulações. **Posologia e via de administração:** Para administração oral. É recomendada uma dose inicial de 2 a 4 mg de carprofeno/kg peso corporal/dia, a ser administrada numa única dose ou dividida em duas doses iguais. A dose poderá ser reduzida a 2 mg carprofeno/kg peso corporal/dia, administrada como uma dose diária de manutenção após 7 dias, sujeita a resposta clínica: ver a dose de manutenção na tabela abaixo apresentada. **Tabela da Dose de Manutenção:** Peso Corporal (kg) - Número de comprimidos por dose (50 mg): 12.5 - f; 25.0 - ô; 37.5 - ô; 50 - ô. A duração do tratamento dependerá da resposta observada. Tratamentos de longa duração deverão estar sob supervisão veterinária regular. **Contra-indicações:** A administração deste medicamento veterinário está contra-indicada em gatos. Não administrar a cães que sofram de doença cardíaca, hepática ou renal, em casos onde exista a possibilidade de ulceração gastrointestinal ou hemorragia, ou em casos em que existam evidências de discrasia sanguínea ou hipersensibilidade ao medicamento veterinário. **Reacções adversas:** Foram reportados efeitos secundários típicos associados aos AINE's como vômitos, fezes moles/diarreia, sangue oculto nas fezes, perda de apetite e letargia. Estas reacções adversas ocorrem geralmente durante a primeira semana de tratamento e na maior parte dos casos são passageiros e desaparecem após o termo do tratamento mas em casos raros podem ser severos ou fatais. Caso ocorram reacções adversas, a administração do medicamento veterinário deve ser suspensa e deve informar-se o médico veterinário. Como acontece no caso de outros AINEs, existe o risco de ocorrerem efeitos idiossincráticos adversos a nível renal e hepático. **Medicamento veterinário sujeito a receita médico veterinária.** N.º A.I.M.: 51537; **Apresentações:** Tubos de Polipropileno selados com fibra de algodão e cápsulas brancas de polietileno em tubos de 100 e 500. Blisters de Alumínio contendo 10 comprimidos (50 mg) por tira em caixas de 20, 100 e 500 comprimidos. **TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO:** Norbrook Laboratories Limitada, Station Works, Camlough Road, NEWRY, Co. Down, BT35 6JP, Irlanda do Norte. **Distribuidor:** PRODIVET, Comércio de Produtos Químicos, Farmacêuticos e Cosméticos, SA - Av. Infante D. Henrique nº 333 H 3º piso Esc. 41 - 1800-282 Lisboa

NOROCARP 100 mg comprimidos para cães

COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Cada comprimido contém: Substância(s) activa(s): Carprofeno 100 mg. **FORMA FARMACÉUTICA:** Comprimidos. Um comprimido circular amarelo com 8 mm de diâmetro, uma linha de corte numa face e o número "100" na face oposta. **Espécie(s)-alvo:** Caninos (Cães). **Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo:** Em cães: Redução da inflamação e dor provocada por perturbações músculo-esqueléticas e doença degenerativa das articulações. No seguimento de analgesia parenteral no manejo da dor pós-operatória. **Posologia e via de administração:** Para administração oral. 4 mg de carprofeno por kg de peso corporal por dia. A dose inicial de 4 mg de carprofeno por kg de peso corporal por dia poderá ser administrada numa dose diária única ou em duas doses divididas igualmente. A dose diária pode ser reduzida consoante a resposta clínica. A duração do tratamento dependerá da resposta verificada. Tratamentos de longa duração deverão ser monitorizados pelo médico veterinário. Não exceder a dose estabelecida. Para aumentar a cobertura analgésica no pós-operatório, deverá ser feita terapia parenteral pré-operatória com carprofeno injectável seguido de «Norocarp 100 mg comprimidos para cães» na dose de 4 mg por kg de peso corporal por dia durante mais de 5 dias. Recolocar os comprimidos partidos no blister e administrá-los nas 48 horas seguintes. **Contra-indicações:** Não administrar a gatos. Não administrar a cadélas gestantes ou lactantes. Não administrar a cachorros com menos de 4 meses de idade. Não administrar em casos de hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. Não administrar a cães que sofram de doença cardíaca, hepática ou renal, em casos onde exista a possibilidade de ulceração gastrointestinal ou hemorragia, ou em casos em que existam evidências de discrasia sanguínea. **Reacções adversas:** Foram reportados efeitos secundários típicos associados aos AINE's como vômitos, fezes moles/diarreia, sangue oculto nas fezes, perda de apetite e letargia. Estas reacções adversas ocorrem geralmente durante a primeira semana de tratamento e na maior parte dos casos são passageiros e desaparecem após o termo do tratamento mas em casos raros podem ser severos ou fatais. Caso ocorram efeitos adversos, a administração do medicamento veterinário deve ser suspensa e deve informar-se o médico veterinário. Como acontece no caso de outros AINEs, existe o risco de ocorrerem efeitos idiossincráticos adversos a nível renal e hepático. **Medicamento veterinário sujeito a receita médico veterinária.** N.º A.I.M.: 159/01/09DFVPT; **Apresentações:** Tubos de Polipropileno selados com fibra de algodão e cápsulas brancas de polietileno em tubos de 14, 30 e 100 comprimidos. Blisters de Alumínio contendo 10 comprimidos por tira em caixas de 10, 20, 30, 50, 60, 70, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500 e 1000 comprimidos. **TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO:** Norbrook Laboratories Limitada, Station Works, Camlough Road, NEWRY, Co. Down, BT35 6JP, Irlanda do Norte. **Distribuidor:** PRODIVET, Comércio de Produtos Químicos, Farmacêuticos e Cosméticos, SA - Av. Infante D. Henrique nº 333 H 3º piso Esc. 41 - 1800-282 Lisboa

Distribuidor em Portugal

PRODIVET ZN

NUTRIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS,
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS, SA

Av. Infante D. Henrique, nº 333-H, 3º piso, Esc. 41
1800-282 Lisboa Tel.: 218 511 493 Fax: 218 511 494
email: geral@prodivetzn.pt
web: www.prodivetzn.pt

NOROCARP

para alívio da dor e redução
da inflamação crónica em cães



20
mg

50
mg

100
mg

PRODIVET ZN

NOROCARP

20
mg

NOROCARP




50
mg

NOROCARP

100
mg

Blisters de fácil dispensa e
com identificação **pela cor**

Nova dosagem



Caixas de 100 comprimidos

Caixas de 100 comprimidos
Caixas de 500 comprimidos

Caixas de 20 comprimidos
Caixas de 100 comprimidos
Caixas de 500 comprimidos