

Sinergia de confiança.  
Sem quebras.



# Lismay

Lincomicina /Espectinomicina

SOLUÇÃO INJECTÁVEL

Frascos **sem**  
**quebras**

Preço mais  
vantajoso

MAYMO

# Lismay

Lincomicina /Espectinomicina

## SOLUÇÃO INJECTÁVEL

Sinergia de confiança. Sem quebras.



- **Antibiótico de eleição** para casos de pneumonias e disenteria em suínos, e enterites e pneumonias dos vitelos.
- Frascos de polipropileno para **evitar quebras**.
- Apresentações de 250 ml e 500 ml: **preço por ml mais vantajoso**.

**LISMAY SOLUÇÃO INJECTÁVEL**, 50 + 100 mg/ml, para suínos, vitelos, ovinos, cães e gatos. **COMPOSIÇÃO** 1 ml de solução contém: lincomicina base (como cloridrato) 50 mg, espectinomicina base (como sulfato tetra-hidratado) 100 mg. **ESPÉCIES ALVO** Suínos, vitelos, ovinos, cães e gatos. **INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO** Tratamento das infecções provocadas por microrganismos sensíveis à actividade da lincomicina e/ou da espectinomicina em suínos, vitelos, ovinos, cães e gatos, entre as quais as causadas por: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bacteroides* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Clostridium perfringens*, *Clostridium tetani*, *Campylobacter* spp., *Corynebacterium pyogenes*, *Escherichia coli*, *Fusobacterium* spp., *Haemophilus* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *Mycoplasma* spp., *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp. e *Streptococcus* spp. **Suínos:** terapêutica das pneumonias bacterianas e a micoplasmas, disenteria hemorrágica (por exemplo enterite necrótica superficial por *B. hyodysenteriae*), enterites bacterianas e artrites infecciosas. **Vitelos:** terapêutica das enterites e/ou pneumonias dos vitelos, provocadas por microrganismos bacterianos. **Ovinos:** terapêutica das afecções cutâneas dos cascos dos ovinos provocadas por *Bacteroides nodosus* e nas infecções respiratórias dos ovinos, primárias ou secundárias, provocadas por micoplasmas ou bactérias. **Cães:** terapêutica das infecções respiratórias, da pele e das vias urinárias e das infecções bacterianas secundárias associadas a doenças víricas. Com Lismay solução injectável podem assim tratar-se pneumonia, faringite, amigdalite, bronquite, piodermite, dermatite pustular, abscessos, cistite, metrite e gastroenterite. **Gatos:** terapêutica das infecções do tracto urinário, das vias respiratórias superiores, das infecções localizadas e das infecções bacterianas secundárias associadas a doenças víricas. Com Lismay solução injectável podem assim tratar-se: cistites, infecções bacterianas secundárias associadas à panleucopenia, pneumonia, rinotraqueíte, infecções das vias respiratórias superiores, feridas infectadas e abscessos. **CONTRA-INDICAÇÕES** Hipersensibilidade a um dos dois antibióticos livres ou à sua associação, ou mesmo a algum dos excipientes. Não administrar a coelhos, hamsters, porquinhos-da-índia, chinchilas, cavalos ou ruminantes, uma vez que poderá causar distúrbios gastrointestinais graves. **PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO** A administração deve ser baseada em testes de sensibilidade das bactérias isoladas do animal. Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento veterinário não deve ser misturado com outros medicamentos veterinários. As pessoas com hipersensibilidade conhecida à lincomicina e/ou à espectinomicina devem administrar o medicamento com precaução e utilizando EPI adequado. Deverão ser tomadas precauções para evitar a autoinjecção acidental. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Lavar qualquer derrame do medicamento veterinário imediatamente com água abundante. Lavar as mãos após a administração. **REAÇÕES ADVERSAS** Podem verificar-se sinais ocasionais de dor no local da injeção, que nunca dão origem a reacções inflamatórias graves. Foram referidos fenómenos ocasionais de diarreia transitória em ovinos e porcos. Raramente são referidos casos de aborto e/ou morte em ovinos tratados durante o último terço de gestação. **INTERAÇÕES** A lincomicina possui actividade intrínseca de bloqueio neuromuscular, pelo que é necessário ter especial atenção se forem utilizados simultaneamente outros agentes neurobloqueadores (relaxantes musculares). Parece existir um antagonismo farmacológico entre a lincomicina e a eritromicina, pelo que deve ser evitada a utilização concomitante com eritromicina. Aconselha-se a não associar lincosamidas e macrólidos devido à semelhança dos mecanismos de acção. **POSOLOGIA E VIA DE ADMINISTRAÇÃO** Suínos: 1 ml/10 kg pv por via intramuscular (eq. a 5 mg de lincomicina base e 10 mg de espectinomicina base/kg pv). Se necessário, pode repetir-se o tratamento com intervalos de 24 horas durante 3-7 dias. Vitelos: 1 ml/10 kg pv por via intramuscular (eq. a 5 mg de lincomicina base e 10 mg de espectinomicina base/kg pv) 12-12 horas no primeiro dia e depois 24-24 horas durante 2-4 dias. Ovinos: 1 ml/10 kg pv por via intramuscular (eq. a 5 mg de lincomicina base e 10 mg de espectinomicina base/kg pv) 24-24 horas durante 3 dias consecutivos. Cães e gatos: 1 ml/5 kg pv por via intramuscular (eq. a 10 mg de lincomicina base e 20 mg de espectinomicina base/kg pv). O tratamento pode ser repetido com intervalos de 12-12 ou 24-24 horas até a um máximo de 21 dias. **INTERVALO DE SEGURANÇA** Carne e vísceras: Vitelos: 21 dias. Suínos: 12 dias. Ovinos: 7 dias. Não é autorizada a administração a ovinos produtores de leite destinado ao consumo humano. **INCOMPATIBILIDADES** Na ausência de estudos de compatibilidade, este medicamento veterinário não deve ser misturado com outros medicamentos veterinários. **PRAZO DE VALIDADE** Prazo de validade tal como embalado para venda: 2 anos. Após a primeira abertura do acondicionamento primário: 15 dias. **APRESENTAÇÕES** Frascos de plástico (polipropileno) de 100 ml, 250 ml e 500 ml. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. **TITULAR DA AUTORIZAÇÃO** Laboratorios Maymó, S.A. **NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO** 932/01/15NFVPT. Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

Laboratorios MAYMÓ,S.A.  
Via Augusta, 302  
08017 Barcelona  
Tel. 932 370 220  
comercial@maymo.es

www.maymo.es

**MAYMÓ**