

# PestiGon<sup>®</sup>

Spray

2,5 mg/ml solução para  
pulverização cutânea

para **GATOS** e **CÃES**



100/250/500 ml

**Fipronil**

*Pulgas, carrças e piolhos mordedores  
Caninos e Felinos*

  
**PRODIVET ZN**

NUTRIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS, SA

# PestiGon®



## 2,5 mg/ml solução para pulverização cutânea para gatos e cães

### NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO E DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE FABRICO RESPONSÁVEL PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE, SE FOREM DIFERENTES

Titular da autorização de introdução no mercado e fabricante responsável pela libertação dos lotes:

Norbrook Laboratories Limited,  
Station Works,  
Newry,  
Co. Down,  
BT35 6JP,  
Irlanda do Norte

### NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

PESTIGON 2,5 mg/ml solução para pulverização cutânea para gatos e cães  
Fipronil

### DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) E OUTRA(S) SUBSTÂNCIA(S)

Cada ml contém:

**Substância ativa:**

Fipronil 2,5 mg  
Solução para pulverização cutânea.  
Solução límpida e incolor.

### INDICAÇÕES

Tratamento de infestações por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) e carraças (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) em cães e gatos.

Tratamento de infestações por piolhos mordedores em cães (*Trichodectes canis*) e gatos (*Felicola subrostratus*).

O medicamento veterinário pode ser utilizado como parte de uma estratégia de tratamento da Dermatite Alérgica à Picada de Pulga (DAPP), quando tiver sido previamente diagnosticada por um médico veterinário.

A eficácia inseticida contra novas infestações por pulgas adultas persiste até 2 meses em gatos e até 3 meses em cães, dependendo do meio ambiente.

O medicamento veterinário tem uma eficácia acaricida persistente até 4 semanas contra carraças, dependendo do nível de infestação do meio ambiente.

### CONTRAINDICAÇÕES

Não administrar a coelhos, porque podem ocorrer reações adversas e até mesmo a morte. Não administrar a animais doentes (doenças sistêmicas, febre...) ou convalescentes. Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a algum dos excipientes.

### REAÇÕES ADVERSAS

Se o animal se lambem, pode observar-se um período curto de hipersalivação devido sobretudo à natureza do excipiente.

Entre as reações adversas extremamente raras reportadas após a administração contam-se as reações cutâneas transitórias incluindo inflamação, prurido ou atopia. Excepcionalmente observou-se hipersalivação, sintomas neurológicos reversíveis (hiperestesia, depressão, sintomas nervosos), vômitos ou sintomas respiratórios, após a administração. Não administrar uma dose excessiva. Em caso de sobredosagem, iniciar um tratamento sintomático apropriado.

Caso detete efeitos graves ou outros efeitos não mencionados neste folheto, informe o seu médico veterinário.

### ESPÉCIES-ALVO

Canimos (Cães) e Felinos (Gatos).

### DOSAGEM EM FUNÇÃO DA ESPÉCIE, VIA(S) E MODO DE ADMINISTRAÇÃO

#### Modo de administração:

Pulverizar o corpo inteiro do animal, a uma distância aproximada de 10-20 cm.

Aplicar no sentido oposto ao pêlo e garantir que toda a pelagem fica humedecida. Massajar a pelagem, especialmente em animais de pêlo comprido, de modo a que o medicamento veterinário possa penetrar até à pele. Para o tratamento da região da cabeça, e quando os animais a tratar forem jovens ou animais nervosos, a aplicação deve ser feita pulverizando numa luva, esfregando seguidamente a luva impregnada com o medicamento veterinário na pelagem. Permitir que o pêlo seque ao natural. Não secar com uma toalha.

#### Posologia:

De forma a humedecer o pêlo até à pele, dependendo do comprimento do pêlo, aplicar 3 a 6 ml por kg de peso corporal, (7,5 a 15 mg de substância ativa por kg de peso corporal), isto é, 6 a 12 pulverizações por kg de peso corporal da apresentação de 100 ml, ou 2 a 4 pulverizações por kg de peso corporal das apresentações de 250 ml e de 500 ml.

A dose pode ser determinada da seguinte forma:

Gato/cão de pêlo curto, i.e. comprimento do pêlo inferior a 2cm.

Dose: 3-4 ml/kg de peso corporal  
Embalagem de 100 ml: 6 pulverizações por kg de peso corporal  
Embalagens de 250 ml e 500 ml: 2 pulverizações por kg de peso corporal

Cão de pêlo médio/gato de pêlo comprido, i.e. comprimento do pêlo 2 - 4 cm.

Dose: 4-5 ml/kg de peso corporal  
Embalagem de 100 ml: 9 pulverizações por kg de peso corporal  
Embalagens de 250 ml e 500 ml: 3 pulverizações por kg de peso corporal  
Cão de pêlo comprido/ gato de pêlo mais comprido, i.e. comprimento do pêlo superior a 4 cm.

Dose: 5-6 ml/kg de peso corporal  
Embalagem de 100 ml: 12 pulverizações por kg de peso corporal  
Embalagens de 250 ml e 500 ml: 4 pulverizações por kg de peso corporal

A embalagem de 100 ml contém aproximadamente 8 tratamentos para um gato de tamanho médio de pêlo curto (4 kg). A embalagem de 250 ml contém aproximadamente 4 tratamentos para um cão de tamanho médio de pêlo curto (20 kg). A embalagem de 500 ml contém aproximadamente 8 tratamentos para um cão de tamanho médio de pêlo curto (20 kg).

Note que: o comprimento do pêlo (curto, médio, comprido) é fornecido como um guia aproximado e depende das espécies. É importante garantir que toda a pelagem do animal fica humedecida, até à pele, especialmente em animais de pêlo comprido.

Os cachorros e gatinhos a partir dos 2 dias de idade podem ser tratados com segurança; no entanto, deve ser tomada atenção especial para determinar com exatidão o peso corporal para animais jovens, de forma a que o número de pulverizações necessárias possa ser calculado com precisão utilizando o guia prático acima.

### Guia prático para tratamento com o medicamento veterinário

A tabela seguinte é um guia para demonstrar o número aproximado de pulverizações necessárias para o tratamento de gatos e cães de acordo com o peso corporal. O número adequado de pulverizações deve ser calculado utilizando o guia prático acima.

É muito importante pesar os animais muito pequenos com exatidão, em particular os cachorros e gatinhos, e calcular a dose tal como descrito na secção dosagem acima.

Cães e gatos de pêlo curto (Comprimento do pêlo <2cm)	Cães de pêlo médio/gatos de pêlo comprido (Comprimento do pêlo 2-4cm)	Cães e gatos de pêlo comprido (Comprimento do pêlo >4cm)
<b>Embalagem de 100 ml (Dispensa 0,5 ml de medicamento por pulverização)</b>		
Gatos/Raças miniatura (4 kg) ex. Toy Poodle 24 pulverizações	36 pulverizações	48 pulverizações
48 pulverizações	Raças pequenas (8 kg) ex. Terrier 72 pulverizações	96 pulverizações
<b>Embalagem de 250 ml (Dispensa 1,5 ml de medicamento por pulverização)</b>		
Gatos e raças pequenas de cães (5 kg) 10 pulverizações	15 pulverizações	20 pulverizações
30 pulverizações	Raças médias (15 kg) ex. Spaniel 45 pulverizações	60 pulverizações
60 pulverizações	Raças grandes (30 kg) ex. Labrador 90 pulverizações	120 pulverizações
<b>Embalagem de 500 ml (Dispensa 1,5 ml de medicamento por pulverização)</b>		
Gatos e raças pequenas de cães (5 kg) 10 pulverizações	15 pulverizações	20 pulverizações
30 pulverizações	Raças médias (15 kg) ex. Spaniel 45 pulverizações	60 pulverizações
60 pulverizações	Raças grandes (30 kg) ex. Labrador 90 pulverizações	120 pulverizações

### INSTRUÇÕES COM VISTA A UMA UTILIZAÇÃO CORRETA

Para melhorar a eficácia, não se recomenda dar banho ou ensaboar os animais dois dias antes ou após o tratamento com o medicamento veterinário. [Consultar também a secção "Informação Adicional" deste folheto informativo].

#### O tratamento:

- Tratar o animal num local bem ventilado ou ao ar livre. Usar luvas protetoras de PVC ou de nitrilo. Recomenda-se o uso de um avental impermeável para proteger o vestuário.
- Verificar a bomba pulverizadora carregando na ponta da bomba. Deverá libertar um cone de spray. Não inalar o spray.
- Conter o animal para mantê-lo quieto. Colocar uma coleira no seu animal vai ajudá-lo a mantê-lo com mais firmeza.
- Massajar a pelagem no sentido oposto ao pêlo, como preparação para a pulverização.

- Segurar o dispensador verticalmente, afastado a uma distância de 10-20 cm do pêlo, depois aplicar o spray, humedecendo a pelagem, até à pele. Pode ser encontrado um guia para o número aproximado de pulverizações necessárias na secção anterior deste folheto informativo.
- Não esquecer de aplicar o spray na parte ventral do animal, pescoço e patas. Para ter acesso à parte ventral do cão, deverá encorajá-lo a rebolar ou a sentar. No caso dos gatos, poderá ter de o levantar para ter acesso a esta área.
- Para garantir a aplicação em toda a região da cabeça, a aplicação do spray deve ser feita pulverizando numa luva, esfregando seguidamente com cuidado a luva impregnada na face do animal, evitando os olhos e as orelhas.
- No tratamento de cachorros, gatinhos ou gatos nervosos, poderá utilizar uma luva para aplicar o medicamento em todo o animal.
- Quando o animal tiver sido adequadamente tratado, massajar toda a pelagem de forma a assegurar-se que o spray possa penetrar até à pele. Permitir que o animal seque ao natural num local bem ventilado.
- Mantener o animal tratado longe de chamas ou outras fontes de calor, e superfícies que sejam facilmente afetadas por álcool até o animal estar seco e pelo menos, 30 minutos após o tratamento.
- Não fumar, beber ou comer durante a aplicação do spray. Não administrar o medicamento veterinário se tiver conhecimento de que apresenta, ou o seu animal apresenta, hipersensibilidade conhecida a inseticidas ou ao álcool. Lavar as mãos após a administração.

### INTERVALO DE SEGURANÇA

Não aplicável.

### PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO

Mantiver fora da vista e do alcance das crianças.

Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Não administrar este medicamento veterinário depois de expirado o prazo de validade indicado no rótulo depois de EXP. Prazo de validade após a primeira abertura do recipiente: 6 meses.

### ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

#### Advertências especiais para cada espécie-alvo

Quando utilizado como parte de uma estratégia de tratamento da dermatite alérgica à picada da pulga, recomenda-se que seja administrado mensalmente ao animal alérgico e aos outros gatos e cães que vivam na mesma casa.

O tratamento da cama, tapetes e outras áreas normais de repouso com um inseticida adequado irá ajudar a reduzir a infestação do meio ambiente e maximizar a duração da proteção conferida pelo medicamento contra a reinfestação. O medicamento veterinário não é adequado para o tratamento direto do meio ambiente.

Para melhorar a eficácia, não se recomenda dar banho ou ensaboar os animais dois dias antes ou após o tratamento com o medicamento veterinário. Dar banho ou ensaboar os animais até 4 vezes em dois meses não mostrou ter um efeito significativo na eficácia residual do medicamento veterinário. Quando os banhos são mais frequentes, é recomendado o tratamento mensal.

#### Precauções especiais para utilização em animais

Não exceder a dose recomendada.

Evitar o contacto do medicamento veterinário com os olhos do animal. Em caso de contacto accidental com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente os olhos com água.

Não administrar diretamente em áreas de pele lesionada. Permitir que os animais tratados sequem em locais bem ventilados (ver também secção 4.5 (iii)).

Não confinar os animais em espaços fechados ou transportadoras até o pêlo estar totalmente seco.

Na ausência de dados específicos de tolerância e eficácia, não se recomenda a administração do medicamento veterinário no tratamento de outras espécies animais que não sejam gatos e cães.

É importante certificar-se que os animais não se lambem uns aos outros após o tratamento.

Pode ocorrer fixação pontual de carraças. Por este motivo a transmissão de doenças infecciosas não pode ser totalmente excluída se as condições forem desfavoráveis.

Mantener os animais tratados longe de chamas ou outras fontes de calor, e superfícies que sejam facilmente afetadas por álcool por, pelo menos, 30 minutos após a administração do medicamento veterinário e até o pêlo estar totalmente seco. Não vaporizar para uma chama ou qualquer material incandescente.

#### Exclusivamente para uso externo.

Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento aos animais

Este medicamento veterinário pode causar irritação das membranas mucosas e dos olhos. Assim, o contacto do medicamento veterinário com a boca e os olhos deve ser evitado. Pessoas com asma ou hipersensibilidade conhecida a inseticidas ou ao álcool devem evitar o contacto com o medicamento veterinário. Evitar que o conteúdo entre em contacto com os dedos. Se isto ocorrer, lavar as mãos com água e sabão. Se ocorrer irritação, dirija-se a um médico. Após exposição ocular accidental, lavar os olhos cuidadosamente com água corrente.

Os animais tratados não devem ser manuseados até o pêlo estar seco, e não se deve permitir que as crianças brinquem com animais tratados até o pêlo estar seco. É portanto recomendado que os animais não sejam tratados durante o dia mas ao início da noite, e que os animais tratados recentemente não durmam com os donos, especialmente com crianças. Pulverizar os animais ao ar livre ou num local bem ventilado. Não inalar o spray. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação.

Usar luvas de PVC ou de nitrilo durante o tratamento dos animais. Recomenda-se o uso de um avental impermeável para proteger o vestuário.

Se o vestuário ficar excessivamente molhado com o medicamento veterinário, deve ser removido e lavado antes de voltar a usar. Descartar as luvas após a utilização e lavar as mãos com sabão e água.

#### Tratamento de vários animais:

Uma boa ventilação é particularmente importante quando é necessário tratar vários animais. Tratar os vários animais ao ar livre, ou reduzir a formação de vapor removendo os animais do local onde são tratados enquanto o álcool evapora e assegurar que o local de tratamento é bem ventilado entre tratamentos individuais. Adicionalmente garantir que o local onde os animais secam é bem ventilado e evitar colocar no mesmo espaço vários animais recentemente tratados.

#### Outras precauções

Este medicamento veterinário é altamente inflamável. Manter afastado do calor, de faíscas, chamas ou outras fontes de ignição.

O fipronil pode afetar adversamente os organismos aquáticos. Não se deve permitir que os cães nadem em cursos de água nos 2 dias após a aplicação.

### PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO OU DOS SEUS DESPERDÍCIOS, SE FOR CASO DISSO

O medicamento veterinário não utilizado ou os seus desperdícios devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

O medicamento veterinário não deve ser eliminado nos cursos de água, porque pode constituir perigo para peixes e outros organismos aquáticos.

### DATA DA ÚLTIMA APROVAÇÃO DO FOLHETO INFORMATIVO

Janeiro de 2015

### OUTRAS INFORMAÇÕES

#### Uso veterinário.

O tratamento da cama, tapetes e outras áreas normais de repouso com um inseticida adequado irá ajudar a reduzir a infestação do meio ambiente e maximizar a duração da proteção conferida pelo medicamento veterinário contra a reinfestação. O excipiente álcool pode ter efeitos adversos sobre superfícies pintadas, envernizadas ou outras superfícies domésticas ou mobiliário.

#### Informação sobre as embalagens

Embalagem de 100 ml de polietileno de alta densidade, equipada com um polipropileno, polietileno, polioximetileno, polietileno de baixa densidade (dip-tube), e uma bomba de spray de polietileno de alta densidade e polietileno de baixa densidade com capacidade para dispensar 0,5 ml por pulverização.

Embalagem de 250 ml e 500 ml de polietileno de alta densidade, equipada com um polipropileno, polietileno, polioximetileno, polietileno de baixa densidade (dip-tube), e uma bomba de spray de polietileno de alta densidade e polietileno de baixa densidade com capacidade para dispensar 1,5 ml por pulverização.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Distribuidor:  
Prodivet-ZN, S.A.  
Av. Infante D. Henrique 333 H 3 piso Esc 41  
1800-282 Lisboa  
Portugal



Av. Infante D. Henrique, 333-H-3º Piso, Esc.41  
1800-282 LISBOA | PORTUGAL  
Telf: (+351) 218 511 493 Fax: (+351) 218 511 494  
Email: geral@prodivetzn.pt  
Web: www.prodivetzn.pt

DISTRIBUÍDO POR:

  
**PRODIVET ZN**  
NUTRIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS E COSMÉTICOS, SA