

ACTACID

Suplemento alimentar líquido para vacas leiteiras,
bezerros, porcos de engorda e aves de capoeira

Av. Infante D. Henrique, 333-H
3º Piso, Esc.41
1800-282 LISBOA

PORTUGAL

Telf: (+351) 218 511 493
Fax: (+351) 218 511 494

Email: geral@prodivetzn.pt

Web: www.prodivetzn.pt

Rev. 1
Agg. ST 12/02/2016

Estas informações são baseadas em conhecimentos actualmente disponíveis, fornecidas pelo fabricante para a Prodivet ZN e do nosso conhecimento, são precisas e completas. No entanto, como especificado, não podem ser consideradas como um direito ou uma garantia.

NOTAS TÉCNICAS:

ACTACID graças ao uso de ácidos e especialmente de ácido fórmico, é capaz, tanto de esterilizar a alimentação como reduzir a capacidade replicativa da Clostridia no intestino.

ACTACID também é utilizado em caso de aquecimento da mistura de prato único e para controlar o desenvolvimento de bactérias e fungos na alimentação animal.

O Ácido fórmico tem um papel fundamental na ação inibidora sobre a multiplicação de Clostridia, tanto nos alimentos como nos alimentados (presença de feno e/ou na palha), como ao nível entérico.

O ácido propiónico regula a fermentação intestinal anormal, devido a um possível excesso de agentes vasoativos, toxinas responsáveis pelo aparecimento de doenças da mama e dos cascos, devidas a uma fermentação anormal da ração diária, mantendo a mistura de prato único "frio" mesmo nas condições mais difíceis.

ADITIVOS (por kg):

Consevantes:

Ácido fórmico E 23	340.000 mg
Ácido propiónico E 280	200.000 mg
Ácido Ortofosfórico 1a338	42.500 mg
Ácido láctico E 270	40.000 mg

VALORES NUTRICIONAIS (on as is):

Humidade	32,7 %
Cinzas brutas	0,4 %

COMPOSIÇÃO:

Glicose e xarope de frutose.

DOSAGEM RECOMENDADA:

Vacas leiteiras	50 - 70 g/Cabeça/dia
Bezerros	6 g/Cabeça/dia
Suínos de engorda	300 - 600 g (por 100 kg de ração)
Aves	50 ml (por litro de água potável, 3-7 dias)

EMBALAGENS



EMBALAGEM 1000 KG



EMBALAGEM 200 KG



EMBALAGEM 25 KG

