




Descrição

SUBSTÂNCIA(S) ACTIVA E OUTROS INGREDIENTES: Cada ml contém: **Substância activa:** Albendazole: 100 mg **Excipientes:** Alcool benzílico (E1519): 10 mg **INDICAÇÕES:** Para o tratamento de infecções causadas por vermes redondos gastrintestinais, vermes pulmonares, ténias e fasciola adulta em bovinos e ovinos, nos parasitas sensíveis ao albendazole. **Vermes redondos gastrintestinais:** *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Bunostomum* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Chabertia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Toxocara* spp. **Vermes pulmonares:** *Dictyocaulus* spp. **Ténias:** *Moniezia* spp. **Fasciolas adultas:** *Fasciola hepatica*, *Dicrocoelium dendriticum*. **ESPÉCIES-ALVOS** Bovinos e ovinos. **DOSAGEM PARA CADA ESPÉCIE VIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO**

Para administração oral. **Bovinos:** Para o tratamento de infecções causadas por vermes redondos gastrintestinais, vermes pulmonares, ténias: 7.5 mg albendazole por kg p.v. (7.5 ml produto/ 100 p.v.) Para o tratamento de infecções causadas por *Fasciola hepatica* e *Dicrocoelium dendriticum* ou em casos de ostertagiose tipo 2: 10 mg albendazole por kg p.v. (10 ml produto/ 100 kg p.v.) **Ovinos:** Para o tratamento de infecções causadas por vermes redondos gastrintestinais, vermes pulmonares, ténias: 5 mg albendazole por kg p.v. (0.5 ml de produto/ 10 kg p.v.) Para o tratamento de infecções causadas por *Fasciola hepatica* e *Dicrocoelium dendriticum*: 7.5 mg albendazole por kg p.v. (0.75 ml de produto/ 10 kg p.v.) **INTERVALO(S) DE SEGURANÇA** Bovinos: Carne e vísceras: 14 dias Leite: 5 dias; Ovinos: Carne e vísceras: 14 dias Não autorizada a utilização em ovinos produtores de leite para consumo humano. Apresentação: 5 litros.



TUDO O QUE SE SABE SOBRE

ALPHALBEN

100 mg/ML

SUSPENSÃO ORAL

FABRICANTE:

Alpha-Vet Animal Health LTD

DISTRIBUÍDO POR:

Prodivet ZN, S.A.

Av. Infante D. Henrique 333 H - 3º Piso -Esc.41
1800-282 Lisboa


PRODIVET ZN

www.prodivetzn.com



ALPHALBEN

1

Alphalben 10% Suspensão Oral é um anti-helmíntico de largo espectro recomendado para bovinos e ovinos

O albendazole, a substância activa, destrói o sistema microtubular nas células de diferentes Nemátodos, Ténias e Fascíola Hepática. Estes microtúbulos são responsáveis pelo transporte intracelular de nutrientes. O Albendazole conduz a uma deficiente absorção da glucose pelos parasitas susceptíveis, conduzindo à sua morte pela fome.

2

Alphalben 10% Suspensão Oral pode ser usada contra numerosos parasitas

Os bovinos e ovinos são ameaçados por diversos endoparasitas: gastrintestinais e pulmonares, nemátodos, cestodes e tremátodos.

Alphalben 10% Suspensão oral é eficaz contra todos eles. Este espectro de acção tão largo poderia se alcançado, normalmente, somente por uma combinação de diversos produtos.

3

A utilização do Alphalben 10% Solução Oral é confortável, o tratamento pode ser feito com uma única dose

O Alphalben 10% Suspensão oral é administrada na boca com uma pistola doseadora, não sendo necessária a administração parenteral.

Pode ser usada em animais de qualquer idade.

4

Alphalben 10% suspensão oral pode ser usado para tratar vacas leiteiras.

A maioria dos produtos antiparasitários não são aplicáveis em vacas leiteiras. Alphalben 10% Suspensão Oral é uma das excepções. O leite pode ser usado para consumo humano 5 dias após o tratamento.

ALPHALBEN

5

Alphalben 10% Suspensão Oral é seguro

Alphalben 10% Suspensão Oral é selectivo nos parasitas, não interfere com as células corporais do hospedeiro. Não é tóxico mesmo em casos de sobredosagem em cinco vezes.

6

Alphalben 10% Oral Suspensão Oral é económico

Dado o seu largo espectro de acção, não são necessárias combinações com outros produtos. O produto pode ser armazenado até 28 dias após a sua abertura.

FÁCIL DE USAR

PODE SER USADO EM
VACAS LEITEIRAS

LARGO ESPECTRO DE
ACÇÃO

ECONÓMICO

