

Laxin

Suporta a digestão, excreção das fezes e amoníaco. Laxin também regula a consistência das fezes.



Laxin ajuda na digestão e desintoxicação ao aumentar osmoticamente a retenção de água no intestino, o que ajuda a prevenir a obstipação. Para além disso, promove a eliminação de toxinas através do movimento dos intestinos e da diminuição do pH no colon e diminuindo o tempo de trânsito intestinal. **Laxin** apresenta-se sob forma de pó, tornando-o fácil de misturar no alimento e de ser transportado, em caso de viagem

Lactulose

Lactulose é um dissacárido que é catabolizado pelas bactérias do intestino. Este processo de catabolismo causa um efeito laxante. A Lactulose pode ajudar a defecação, através do aumento do fluxo de água para o intestino. Este aumento do volume fecal pode, por sua vez, estimular o peristaltismo do intestino. Assim, pode suportar, melhorar e facilitar a excreção fecal. Para além disso, o aumento da absorção de água ajuda a reduzir o tempo de retenção de toxinas e a absorção de substâncias nocivas para o organismo. A Lactulose pode conduzir a um decréscimo do pH intestinal, o que ajuda a aumentar a excreção do amoníaco.

Tipo de produto

Material de alimentação único para cães e gatos.

Apresentação

60g / 170g pó

Composição

Lactulose

Componentes analíticos

Proteína bruta (< 0.3%), cinzas (< 0.4%), fibra bruta (< 0.5%), gordura bruta (< 0.3%), humidade (3.9%).

Modo de emprego

Medir a quantidade de pó especificada com a ajuda da colher doseadora e misturar com a quantidade necessária de água. Recolher a mistura com a seringa incluída. **Laxin** pode ser administrado diretamente ou misturado no alimento.

Dose diária recomendada

Em caso de diarreia, descontinuar a alimentação e reiniciar a administração com uma dose menor. Assegurar uma adequada ingestão de fluidos.

1 x ao dia

Kg peso vivo	Nº de colheres doseadoras*	Quantidade de água para dissolver (ml)
1	0.5	0.75
2-3	1	2.25
4-7	2	1.5
8-11	3	6.75
12-14	4	9
15-18	5	11.25
19-22	6	13.5
23-26	7	15.75
27-30	8	18
31-33	9	20.25
34-37	10	22.5
38-40	11	24.75

*aprox. 1,5g = 1 x (nível colher doseadora)

O restante pode ser descartado ou guardado no frigorífico e utilizar no dia seguinte.

Prazo e informação de validade

Não armazenar acima dos 25°C.

Usar dentro de 6 meses após a abertura.

Quando abrir, retire rapidamente a quantidade necessária de pó e fechar bem o contentor.

Armazenar o contentor bem fechado e em local seco.

Nota

Não utilizar em casos de obstrução intestinal, perfuração intestinal ou risco de perfuração intestinal.

O nível de enchimento é predefinido por razões técnicas.