

Struvex Pó

Promove a descida do pH da urina.



Struvex pó suporta a quebra e eliminação dos cristais de estruvite na bexiga. O efeito diurético do extrato de urtiga suporta o processo de acidificação da metionina. O fungo benéfico *Polyporus umbellatus* fornece suporte adicional à saúde da bexiga. **Struvex pó** não contém aromatizantes e é adequado para animais que sofram de alergias

Polyporus umbellatus moído

O fungo benéfico *Polyporus umbellatus* é recomendado para os cristais da bexiga. O seu especial processo de fabrico melhora a absorção dos nutrientes que contém. Através do chamado processo de quebra da casca, o cogumelo é finamente moído durante a produção para quebrar as paredes celulares. Este procedimento prepara os ingredientes para uma melhor absorção.

Metionina

A metionina leva a uma acidificação da urina. Ao baixar o pH para a zona ácida, a quebra das pedras de estruvite pode ser melhorada e permitir a excreção dos seus componentes através da urina.

Extrato de urtiga (*Urtica dioica*)

A urtiga tem um efeito diurético, o que ajuda à diminuição das inflamações.

Tipo de produto

Alimento complementar para gatos

Apresentação

Pó 50g

Composição

Polyporus umbellatus (moído), pectinas de maçã

Componentes analíticos

Proteína bruta (38.7%), cinzas (2.4%), fibra bruta (1.5%), gordura bruta (0.4%)

Aditivos sensoriais (por kg)

Extrato de urtiga (43 200mg)

Aditivos nutricionais (por kg)

L-metionina (655 000mg)

Modo de emprego

Struvex pó pode ser dado diretamente ou misturado no alimento.

Dose diária recomendada

2x ao dia

Gatos adultos: até 1 nível da colher doseadora

A quantidade a alimentar deve ser baseada no valor de pH da urina.

1 colher doseadora cheia $\hat{=}$ aprox. 0,75g.

Assegurar uma adequada ingestão de fluidos.

Prazo e informação de validade

Não armazenar acima dos 21°C.

Usar dentro de 6 meses após a abertura.

Após abrir, retirar rapidamente o pó necessário e fechar bem o contentor.

Armazenar o contentor bem fechado e em local seco.

Nota

Adequado unicamente a gatos adultos.

Não usar durante a gestação, em casos de doenças renais e hepáticas severas e em casos de obstrução do trato urinário

Monitorizar os níveis de potássio se for evidente uma insuficiência renal, especialmente se forem administrados simultaneamente inibidores da ECA.

Recomendamos verificar regularmente o valor de pH e ir ajustando a quantidade de alimentação, quando necessário

Adequado para animais que sofram de alergias. Sem ingredientes de origem animal.

Não inalar o pó.

O nível de enchimento é predefinido por motivos técnicos.